

**DE VEGETABILIBUS  
PHANEROGAMICIS  
QUAE SPONTE  
CRESCUNT IN  
VARIIS CAVAEDIIS...**

---

Giulio Galletti



DE  
**VEGETABILIBUS PHANEROGAMICIS**  
QUAE SPONTE CRESCUNT IN VARIIS CAVAEDIIS  
ARCHIGYMNASII TICINENSIS

**Dissertatio Inauguralis**

QUAM

CONSENSU ET AUCTORITATE

PERIL. FACULT. M. DIRECTORIS, SPECTABILIS D. DECANI

NEC NON CLARISS. AC CELEBERR. D. D. PROFESSORUM

AUSPICE

**DOCT.<sup>US</sup> JOSEPHO MORETTI**

Botanices Prof., Ord.,

*Pro Doctoris Dignitate*

IN RE MEDICA ADIPISCENDA, SUMMISQUE IN MEDICINA

HONORIBUS AC PRIVILEGIIS RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS

IN ANTIQUISSIMA AC CELEBERRIMA

UNIVERSITATE TICINENSI

Mense Maii Ann. MDCCCXXXVIII

UNA CUM THESISBUS PROPUGNANDIS

*publice offerebat*

**JULIUS GARRETT**


MEDIOLANENSIS



**TICINI REGIT**

EX TYPOGRAPHIA BIZZONI

V. R. UNIVERSITATIS TYPOGRAPH.



*Castello*

# THE FEDERAL GOVERNMENT OF CANADA DEPARTMENT OF JUSTICE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

1900-1901

1900

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900-1901

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

## PROOEMIUM.

**D**um continuo dissertationes inaugurales pro Medicinæ Laurea rite absolvenda praelis exsulant, hucusque vegetabilia sponte crescentia in atriis hujusce celeberrimæ Universitatis omnino neglecta fuere, neque ullus fuit, qui oculo philosophico et botanico sub intuitu de illis pertractasset. Haud immerito proinde mihi haesit in mente, monita sequens mei Botanicae Institutoris de hisce vegetabilibus disserere, atque si possibile esset notiones meis condiscipulis tradere quarum ope, tempus quod inter unam alteramque lectionem interdum decurrit honeste ac jucunde pertranseant. Quod si mea vota omnino fatiscantur, sufficiat mihi munus academicum absolvisse, et modesta saltem desideria in mea pervolvisse mente.

In expositione vero plantarum hujuscemodi, optimum duxi systema sequi Linnaeanum, ex eo quod, licet methodus naturalis pluribus sub aspectibus praestet, et etiam sequatur in praelectionibus Professoris Botanicae hujusce Universitatis, nihilo tamen secius nemo procerte inficiatur systema sexuale quammaxime opitulari in dignoscendis generibus et speciebus plantarum, ac proinde facilius junioribus in botanicis disciplinis arridere.

## DIANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I. — Veronica Linn. et Tournef.*

Calyx 4- raro 5-partitus: corolla rotata limbo 4-partito, lacinia infima angustiore: capsula compressa bilocularis, ovata apice emarginata.

*Species 1. Veronica Polita Fries.*

Foliis cordato-ovatis, inciso-serratis, laevibus, subglabris, pedunculis exsertis, laciniis calycinis ovatis, acutis, nervosis corollam aequantibus, capsula turgida glanduloso-villosa. *Fries* Nov. fl. sv. p. 1. — *V. didyma Bertol.* Flor. ital. 1. p. 101. n. 30. (nec *Tenor.* Fl. nap.) — *V. Agrestis Nocc. et Balb.* Fl. ticin. 1. p. 9. *Allioni.* Fl. ped. 1. p. 78. n. 248. et omn. Bot. ital. (non Linn.) Floret vere. ☉

*Species 2. Veronica Arvensis Linn.*

Foliis inferioribus petiolatis cordato-ovatis, grosse-serratis, floralibus sessilibus flore subsessili

510  
6.

longioribus, capsula obcordata compressa *Linn.*  
Sp. pl. p. 18. Fl. tic. 1. p. 10. Fl. dan. t. 515.  
Floret Aprili, Majo. ☉

*Genus II. — Verbena Linn. et Tournef.*

Calyx quinquefidus, unico dente truncato. Corolla infundibuliformis, subaequalis, curva, limbo subbilabiato quinquelobo. Quatuor semina nuda.

*Species 1. Verbena Officinalis Linn.*

Tetrandra, spicis filiformibus, paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario. *Linn.* sp. pl. I. p. 29. -- Fl. tic. 1. p. 291. -- Flor. danic. tab. 628.  
Floret Julio et Augusto. ☉

Verbena apud veteres usurpabatur in eorum mysticis ritibus. *Haennius*, *Platerus*, alique verbenam contra cephalalgias summo opere exaltarunt. Quoque aqua destillata verbenae in ophthalmiis, nonnullis commendatur. Demum etiam nostra aetate mulierculae verbenam forma cataplasmatibus suppeditant in phlogosibus hepatis et lienis, et quum verbena cuti admota post aliquod tempus colorem induat rubrum hinc profani autumant ipsam sanguineum elicere sudorem. Hodierno tamen aevo haec planta fere omnino e pharmacologiae penu excluditur.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

**Genus I. — *Panicum* Linn. et Jussieu.**

**Calyx trivalvis, valvula exteriore minore.**

**Species 1. *Panicum Viride* Linn.**

Panicula spiciformi, cylindrica, involucellis bifloris, fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Linn. Sp. pl. p. 83. — Fl. tic. 2. p. 211. — Smith. Engl. bot. tab. 875.

Floret Julio et Augusto. ☉

**Species 2. *Panicum Glaucum* Linn.**

Panicula subspicata, cylindrica, spiculis confertis, involucellis, bifloris multi setosis scabris. Linn. Sp. pl. p. 83. — Host. Gram. aust. 2. t. 16. — Fl. tic. 2. p. 211. — *Panicum cynosuroides* Scop. Fl. carn. I. p. 50.

Floret Julio et Augusto. ☉

**Species 3. *Panicum Crus Galli* Linn.**

Panicula subramosa, spiculis alternis secundis, floribus imbricatis, glumis aristatis mucromatisve; rachibus setigeris. Linn. Sp. pl. I. p. 83. — Flor. tic. 2. p. 212. — Host. Gram. austr. 2. t. 19.

Floret aestate. ☉



*Genus II. — Digitaria Hall. et Juss.*

Calyx bivalvis aut trivalvis, concavus: valvula extima minutissima, secunda longitudinis variabilis, intima longitudinem corollae aequat. Corolla bivalvis oblongato-ovata, teres, mutica. Styli longissimi. Nectar fissum. Spicae, digitatae, lineares; floribus geminatis: altero subsessili.

*Species 1. Digitaria Sanguinalis Willd.*

Culmis repentibus, floribus imbricatis, vaginis, foliisque papilloso-pilosis. *Willd. Enum. I. p. 92.* — *Fl. tic. 1. p. 33.* — *Bertol. Fl. ital. I. p. 414.* — *Panicum sanguinale Linn. Sp. pl. 1. p. 84.* — *Smith. Engl. bot. 12. t. 849.*

Floret aestate. ☉

*Species 2. Digitaria Dactylon Scop.*

Spicis patentibus, gluma patentissima scabra, foliis basi ciliatis, stolonibus repentibus. — *Scop. Flor. carn. I. p. 53. n. 73.* — *Allion. Fl. ped. 2. p. 238. n. 2170.* — *Panicum dactylon Linn. Sp. pl. I. p. 85.* — *Plenk Ic. pl. med. I. p. 25. t. 43.* — *Cynodon dactylon Host. Gram. austr. 2. t. 18.* — *Fl. tic. 1. p. 32-33.*

Floret Julio et Augusto. ♀

*Genus III. — Poa Linn.*

*Calyx* bivalvis , multiflorus. *Corolla* bivalvis , ovata , valvulis margine scariosis , acutiusculis.

*Species 1. Poa Annua Linn.*

Panicula diffusa, angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Linn. Sp. pl. I. p. 99.* *Fl. tic. I. p. 43. — Smith. Engl. bot. t. 1141.*

Floret tota aestate. ☉

*Species 2. Poa Megastachya Koel.*

Spiculis lanceolatis , compressis sub 20-floris ; foliis planis , pilosis , vaginis glabriusculis. *Koel. Gram. p. 181. — Briza Eragostis Linn. Sp. pl. p. 103. — Fl. tic. 1. p. 46. — Poa Eragostis Cavan. ic. t. 92. — Bertol. Fl. ital. 1. p. 554. n. 20. excl. synonym.*

Floret August. Septemb. ☉

*Species 3. Poa Eragrostis Linn.*

Spiculis oblongo-linearibus compressis sub-10-floris , foliorum oris et vaginis pilosis. *Linn. Sp. pl. I. p. 100. Schreber. Gräeser. 2. t. 38.*

Floret Jul. Aug. ☉

Nullum pro certo viget dubium relate ad hujusce speciei existentiam, et quamvis nonnulli de hac inficiantur veritate, tamen dum facta loquuntur auctoritates silere queunt.

*Species 4. Poa Pilosa Linn.*

Spiculis linearibus compressis, 7-8 floris, foliorum oris pilosis vaginis glabris. *Linn. Sp. pl. I. p. 100.* — *Flor. tic. 1. p. 44.* — *Host. Gram. aust. 2. t. 68.*

*P. Eragrostis Allion. Fl. ped. 2. p. 247. n. 2214.*  
Floret tota aestate et autumnno. ☉

*Species 5. Poa Rigida Linn.*

Panicula disticho-secunda, rachide marginata, locustis innuptis, terete subulatis, radice fibrosa. *Linn. Sp. pl. 1. p. 101.* — *Fl. tic. 1. p. 44.* — *Engl. bot. t. 1371.*

*Schlerochloa rigida et potens Presl. Cyp. et gram. sicul. p. 45.* — *Gram. Loliac. n. 13. ic. n. 11.* — *Mont. Gram. pag. 37.*

Floret aestate. ☉

## TRIANDRIA TRIGYNIA.

*Genus I. — Polycarpon Linn.*

Calyx quinquephyllus. Petala quinque minima, ovata. Capsula unilocularis, trivalvis.

*Species 1. Polycarpon Tetraphyllum Linn.*

Caule ramoso, prostrato, foliis quaternis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 131.* — *Fl. tic. 1. p. 65.* — *Smith. Engl. bot. 15. t. 1031.*

Floret Majo, Junio et Julio. ☉

## TETRANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I. — Plantago Linn.*

Calyx tetrafidus, corolla tetrafida limbo reflexo, stamina longissima. Capsula bilocularis.

*Species 1. Plantago Major Linn.*

Foliis ovato-glabris, scapo tereti, spica floribus imbricatis. Radix succisa. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 163.

— *Fl. tic.* 1. p. 75. — *Fl. dan. t.* 461.

Floret aestivis mensibus. 2

*Species 2. Plantago Lanceolata Linn.*

Foliis lanceolatis, spica subovata nuda, scapo angulato. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 164. — *Fl. tic.* 1. p. 76. — *Fl. dan. t.* 437.

Floret aestate. 2

## TETRANDRIA TETRAGYNIA.

*Genus I. — Sagina Linn.*

Calyx tetraphyllus, petala quatuor, rarius corolla deficit. Capsula tetralocularis cum quatuor valvis polysperma.

*Species 1. Sagina Procumbens Linn.*

Ramis procumbentibus, petalis brevissimis.

*Linn.* Sp. pl. 1. p. 185. — *Fl. tic.* 1. p. 83. —  
*Seguier.* Pl. veron. t. 5. f. 3.

Floret de mense Aprilis ad Augustum. ☉

PENTANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I.* — *Convolvulus Linn.*

Corolla campanulata, plicata. Stigma bifidum.  
 Capsula bilocularis vel tetralocularis, loculis monospermis aut dispermis.

*Species 1.* *Convolvulus Arvensis Linn.*

Foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis sub-  
 unifloris. *Linn.* Sp. pl. I. p. 218. — *Fl. tic.* 1.  
 p. 97. — *Fl. dan.* t. 459.

Floret aestate. 4

*Genus II.* — *Solanum Linn. et Dunal*

Corolla rotata. Antherae subcoalitae, apice pro-  
 gemino dehiscentes. Bacca bilocularis.

*Species 1.* *Solanum Nigrum Linn.*

Caule inermi herbaceo, foliis ovatis, dentato-  
 angulatis, racemis distichis nutantibus. *Linn.* Sp.  
 pl. I. p. 266. — *Fl. tic.* 1. p. 19. — *Fl. danic.* t.  
 460.

Floret Julio et Augusto. ☉

## PENTANDRIA DIGYNIA.

*Genus I.* — *Herniaria*.

Calyx quinquepartitus. Corolla nuda. Stamina quinque, sterilia. Capsula monosperma.

*Species 1.* *Herniaria Hirsuta Linn.*

*Hirsuta*, glomerulis paucifloris. Flores herbacei. *Linn.* Sp. pl. I. p. 317. — *Smith.* Engl. bot. t. 1379. — *Zannicch.* ven. tab. 254. bona. ☉

*Genus II.* — *Chenopodium Linn.*

Calyx pentaphyllus, pentagonus. Corolla nulla. Semen unicum, lenticulare, superum.

*Species 1.* *Chenopodium Album Linn.*

Foliis romboideo-ovatis, erosis, postice integris, superioribus oblongis, integerrimis; racemis erectis conglobatis, seminibus laevibus. *Linn.* Sp. pl. I. p. 214. — Fl. tic. I. p. 120. — *Smith.* Engl. bot. t. 1723.

Floret Julio et Augusto. ☉

*Species 2.* *Chenopodium Opulifolium Schrad.*

Foliis rhomboideis inaequaliter dentatis, subsinuatis subtus glaucis, florum glomerulis in racemos confertos axillares terminalesve dispositis, se-

14

minibus laevibus. *Schrad. ex De Cand. Fl. fr. suppl. p. 372. — Bergamaschi lett. 1. p. 3!*

*Blitum sylvestre Opuli folio Vaill. Bot. paris. p. 36. n. 5. t. 7. f. 1. bona.*

Floret Augusto, Septembri. ☉

#### PENTANDRIA TRIGYNIA.

*Genus I. — Alsine Linn.*

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia.  
Capsula unilocularis trivalvis.

*Species 1. Alsine Media Linn.*

Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. *Linn. Sp. pl. p. 389. — Fl. tic. 1. p. 151. — Smith. Engl. bot. t. 523.*

Floret de vere ad autumnum. ☉

#### EXANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I. — Rumex Linn.*

Calyx triphyllus. Corolla tripetala cum petalis conniventibus. Semen unicum triquetrum.

*Species 1. Rumex Pulcher Linn.*

Floribus hermaphroditis valvulis dentatis, sub-unica granifera, foliis radicalibus panduriformi-

bus. *Linn.* Sp. pl. I. p. 268. — Fl. tic. 1. p. 172. — *Smith.* Engl. bot. t. 1576.

Floret Junio et Julio. 4

#### OCTANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I.* — *Epilobium Linn.*

Calyx tetrafidus. Petala quatuor. Capsula oblonga infera. Semina papposa.

*Species 1.* *Epilobium Lanceolatum Seb. et Maur.*

Caule tereti, incurvo: foliis lanceolatis in petiolum attenuatis, dentato-serratis nitidis; stigmate tetrapartito. *Sebast. et Maur.* Fl. rom. prodr. p. 138. n. 448. t. 1. f. 2.

*E. montanum* Fl. tic. 1. p. 180 (non *Linn.*).

Floret Augusto et Septembri. 4

#### OCTANDRIA TRIGYNIA.

*Genus I.* — *Polygonum Linn.*

Calyx quinque partitus, corollinus. Corolla nulla. Semen unicum angulatum.

*Species 1.* *Polygonum Aviculare Linn.*

Caule herbaceo procumbente, foliis linearilanceolatis, stipulis scariosis brevibus, floribus



1-2 axillaribus subsessilibus. *Linn. Sp. pl. I. p. 519.* — *Fl. tic. 1. p. 185.* — *Fl. dan. t. 803.*

Floret aestate. ☉

*Species 2. Polygonum Persicaria Linn.*

Floribus exandris, digynis, spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis. Stipulis ciliatis. *Linn. Sp. pl. I. p. 282.* — *Fl. tic. 1. p. 185.* — *Smith. Englis bot. t. 756.*

Floret Julio et Augusto. ☉

*Species 3. Polygonum Lapathifolium Linn.*

Floribus exandris digynis, stipulis muticis, pedunculis scabris, seminibus utrinque depressis. *Linn. Sp. pl. p. 517.* — *Morett. Obs. in Flor. ven. p. 10.* — *Bergamaschi lett. 1. p. 5.*

*P. pennsylvanicum Curt. Flor. Lond. t. 24, 25.* (non *Linn.*).

*Persicaria mitis maculosa Zannich. Ven. p. 208. t. 123.* (excl. synonym.).

Floret August. Septemb. ☉

DECANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I. — Tribulus Linn.*

Calyx quinque partitus. Petala quinque patentia. Pistilli sexiles. Capsulae gibbae, spinosae, polyspermae.

*Species 1. Tribulus Terrestris Linn.*

Caulibus prostratis, foliolis 6-jugatis, sub-aequalibus, carpellis quatuor cornubus. *Linn. Sp. pl.* p. 554. — *Fl. tic. 1.* p. 191. — *Hort. rom. 5.* t. 17. — *Matthiol. Comment. ed Valgr. 1554.* p. 441. fig. 1. — *Zannich. Ven. f. 222.*

Floret Julio. ☉

#### DECANDRIA DIGYNIA.

*Genus I. — Saxifraga Linn.*

Calyx quinque partitus. Corolla pentapetala. Capsula birostris, unilocularis, polysperma.

*Species 1. Saxifraga Tridactylites Linn.*

Foliis caulinis cuneiformibus, trifidis, alternis, caule erecto ramoso. *Linn. Sp. pl. 1.* p. 380. *Fl. tic. 1.* p. 194. *Sternberg Revis. t. 17.* fig. 3. *Polin. Fl. ver. 2.* t. 1. f. 1.

Floret primo vere. ☉

#### DECANDRIA TRIGYNIA.

*Genus I. — Arenaria Linn.*

Calyx pentaphyllus, patens. Corolla pentapetala integra. Capsula unilocularis, polysperma.

*Species 1. Arenaria Tenuifolia Linn.*

Folia subulata; caulis paniculatus; capsulae erectae, petala lanceolata, calyce breviora. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 607. *Fl. tic.* 1. p. 204. *Fl. danic.*  
*t.* 289. *Smith Engl. bot.* 219.

Floret Majo et Junio. ☉

*Species 2! Arenaria Serpillifolia Linn.*

Folia subovata, sessilia, acuta. Corollae calyce breviores. *Linn.* *Sp. pl.* 1. p. 606. *Fl. tic.* 1. p. 203. *Flor. danic.* *t.* 977.

Floret Majo et Junio. ☉

## DECANDRIA PENTAGYNIA.

*Genus I. — Lychnis Linn.*

Calyx monophyllus oblongus levis. Corolla pentapetala unguiculata, limbo subbifido. Capsula quinque locularis.

*Species 1. Lychnis Flos Cuculi Linn.*

Petala quadrifida; fructus subrotundus. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 625. *Fl. tic.* 1. p. 208. *Flor. danic.*  
*t.* 590.

Floret mensibus Maji et Junii. 4

*Genus II. — Oxalis Linn.*

Calyx penta sepalus. Corolla penta petala unguibus connexa. Capsula pentagona angulis dehiscens.

*Species 1. Oxalis Corniculata Linn.*

Caulis ramosus, diffusus, pedunculis umbelliferis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 623. Fl. tic. 1. p. 207. Jaq Oxal. t. 5.*

Floret de Mayo ad autumnum. ☉

*Oxalis Corniculata* et *Acetosella* gaudent acido oxalico cum potassa nupto, proindeque iisdem inserviunt usibus. Apud Indas ex foliis, caulibus et floribus *Oxalis Corniculatae* electuarium depromitur quod scopo deprimente bis de die ad cochlear usurpatur.

*Genus III. — Cerastium Linn.*

Calyx pentasepalus; petala bifida. Capsula unilocularis apice dehiscens.

*Species 1. Cerastium Vulgatum Linn.*

Hirsutum, foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, floribus pedunculo longioribus, capsulis oblongis, caulibus diffusis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 627. Fl. tic. 1. p. 210. Smith Engl. bot. t. 789.*

Floret Mayo et Julio. ☉

DODECANDRIA MONOGYNIA.

*Genus I. Portulacca Linn.*

Corolla pentapetala. Calyx bifidus. Capsula unilocularis circumscissa.

*Species 1. Portulacca Oleracea Linn.*

Caulis ramosus prostratus ; folia cuneiformia ;  
 flores conferti sessiles. *Linn. Sp. pl.* 1. p. 638.  
*Fl. tic.* 1. p. 215. *DeCand. pl. grass.* t. 123.  
 Floret Julio et Augusto. ☉

## DIDYNAMIA GYMnosPERMIA.

*Genus I. — Prunella Linn.*

Calyx bilabiatus. Corolla labiata. Stamina fila-  
 mentis bifurcatis, apice altero antherifero, altero  
 nudo.

*Species 1. Prunella Vulgaris Linn.*

Caulis basi prostratus: subhirsutus, folia ovato-  
 lanceolata, subdentata, petiolata ; flores spicati ;  
 calyces labio superiore truncato, triaristato. *Linn.*  
*Sp. pl.* 1. p. 837. *Fl. tic.* 1. p. 290. *Fl. dan.*  
 t. 910. *Smith Engl. bot.* t. 921.  
 Floret Junio et Julio. ☿

## TETRADYNAMIA SILICULOSA.

*Genus I. — Erophyla DeC.*

Calyx aequalis laxiusculus ; petala bipartita ;  
 stamina edentula ; silicula ovalis aut oblonga,  
 septo membranaceo, valvulis planiusculis, stig-  
 mate sessili ; semina biseriata.

*Species 1. Erophyla Vulgaris DeC.*

Siliculis ellipticis pedicellis brevioribus, scapis  
5-12. floris. *DeC. Regn. veg. Syst. natur. 2. p. 356.*

*Draba Verna. Linn. Sp. pl. p. 896. Fl. tic. 2.*  
*p. 2. Engl. bot. t. 586.*

Flor. Martio, Aprili. ☉

*Genus II. — Thlaspi Dill.*

Calyx patulus. Petala aequalia. Silicula emarginata, obcordata, polysperma, valvulis navicularibus, marginato-crenatis.

*Species 1. Thlaspi Bursa-pastoris Linn.*

Foliis subhirsutis, radicalibus pinnatifidis, lyratis, caulinis lanceolato-sagittatis, sessilibus, siliculis triangularibus. *Linn. Sp. pl. p. 993. Fl. tic. 2. p. 7. Fl. danic. t. 729.*

*Capsella Bursa Pastoris DeC. Syst. 2. p. 383.*  
Floret a vere ad autumnum. ☉

#### TETRADYNAMIA SILIQUOSA.

*Genus I. — Cardamine Linn.*

Calyx subhians. Petala patentia, unguibus longis erectis. Stigma integrum. Siliqua elastica dissiliens, valvulis revolutis.

*Species 1. Cardamine Hirsuta Linn.*

Caulis striatus plus minusve hirsutus, folia pin-  
nata, foliola ovato-rotundata, sub-dentata, petio-  
lata. *Linn. Sp. pl.* p. 915. *Fl. tic.* 2. p. 13. *Fl.*  
*Londin.* t. 48.

Floret Aprile et Majo. ☉

*Genus II. — Sisymbrium All. Scop. DeC.*

Calyx basi aequalis; petala integra; stamina  
edentula; siliqua sessilis teretiuscula, valvis con-  
cavis, stylo vix ullo, septo membranaceo; semina  
oblongo-ovata uniserialia.

*Species 1. Sisymbrium Officinale Scop.*

Foliis runcinatis pilosis, caule piloso, siliquis  
subulatis rachì adpressis *Scopol.* *Fl. carn.* 2. p.  
26. *DeC. Regn. veg.* 2. p. 459.

*Erysimum officinale Linn. Sp. pl.* p. 922. *Fl.*  
*tic.* 2. p. 18. *Fl. dan.* t. 560.

Floret Junio, Julio, Augusto. ☉

*Genus III. — Arabis Linn.*

Calyx connivens foliolis duobus basi gibbis.  
Glandulae nectariferae quatuor; oblongae, squa-  
miformes, reflexae. Stigma simplex. Siliqua linea-  
ris, compressa, torulosa.

*Species 1. Arabis Thaliana Linn.*

Folia radicalia oblonga, sub dentata, petiolata; caulina lanceolato-oblonga, sessilia; petala calyce duplo majora. *Linn. Sp. pl. p. 929. Fl. tic. 2. p. 20. Fl. Londin. t. 49.*

Floret Aprile et Majo. ☉

Omnia vegetabilia spectantia ad classem tetradynamicam pollent acido libero, atque virtute gaudent anti-putrida nec non antiscorbutica.

#### MONADELPHIA POLYANDRIA.

*Genus 1. — Malva Linn.*

Calyx duplex, exterior trisepalus, interior pentafidus. Capsulae plurimae monospermae in orbem dispositae.

*Species 1. Malva Sylvestris Linn.*

Caulis erectus, herbaceus, folia septem lobata acuta; pedunculi et petioli pilosi. *Linn. Sp. pl. p. 969. Fl. tic. 2. p. 31. Fl. danic. t. 1223. Smith Englis. bot. t. 761.*

Floret aestate. 4

Virtutes emollientes Malvae omnibus dignoscuntur. Folia reapse hujusce plantae sub forma cataplasmatibus, clysmatibus, decoctis, fomenti et sic porro praedicantur in adfectionibus catarrhalibus, rheumaticis, cutaneis, erysipelaceis et similibus morbis indolis phlogisticis (Ad mentem clarissi-



mi *Pithagorae* per usum malvae quoque intellectus acuebatur ).

DIADELPHIA DECANDRIA.

*Genus I. — Trifolium Tournef.*

Flores sub capitati. Legumen vix calyce longius, non dehiscens, deciduum.

*Species 1. Trifolium Repens Linn.*

Caulis repens, foliola ovato-serratula; capituli pedunculati; flores senescentes deflexi, calyces dentibus superioribus longioribus; legumina tetrasperma. *Linn. Sp. pl. p. 1080. Fl. tic. 2. p. 61. Flor. danic. t. 990.*

Flores erumpunt de Majo ad Septembrem. 4

*Species 2. Trifolium Hybridum Linn.*

Caule adscendente solido, dentibus calycinis rectis, leguminibus tetraspermis, vexillo brevioribus. *Linn. Sp. pl. p. 1079. Fl. tic. 2. p. 61. Sturm Dentschl. Fl. 15. t. 5.*

Floret Julio et Augusto. 4

*Species 3. Trifolium Fragiferum Linn.*

Caulibus repentibus, foliolis ovatis, capitulis subglobosis pedunculatis, calycibus fructiferis inflatis, membranaceis villosis. *Linn. Sp. pl. p. 1086. Fl. ticin. 2. p. 68. Fl. dan. t. 1042.*

Floret Junio et Julio. 4

**Genus II. — *Medicago* Linn.**

Legumen compressum, lunatum, subcontortum.  
Corolla deflectens carinam a vexillo.

*Species 1. Medicago Lupulina* Linn.

Peduncoli spiccati; spicae ovaes; legumina reniformia, striata, monosperma; folia obovata; caulis procumbens. *Linn. Sp. pl. p. 1097. Fl. tic. 2. p. 73. Smith. Englis. bot. t. 971.*

Floret aestivis mensibus. ☉

SYNGENESIA POLYGAMIA AEQUALIS.

**Genus I. — *Cichorium* Linn.**

Calyx calyculatus. Receptaculum sub paleaceum. Pappus polyphyllus paleaceus.

*Species 1. Cichorium Intybus* Linn.

Flor. axillaribus geminis subsessilibus, foliis runcinatis. *Linn. Sp. pl. p. 1142. Fl. tic. 2. p. 97. Fl. danic. t. 607.*

Floret aestate. ♀

**Genus II. — *Taraxacum* Hall. Lam.**

Involucrum duplex, foliolis exterioribus brevissimis; saepius revolutis; receptaculum nudum, pappus stipitatus pilosus.

*Species* 1. *Taraxacum Leontodon* Moret. in *Parrol.* de  
Tarax. Leont. hist. bot. Diss. p. 12.

Foliis runcinatis dentatis glabris; involucris  
calycinis exterioribus reflexis. *Castigl. Veg. Cay.*  
*Borr.* p. 24.

*T. officinale* *Vill.* Dauph. 3. p. 72. *Suffr.*  
*Frioul.* p. 175.

*T. dens-leonis* *Desf.* Fl. atl. 2. p. 228. *Seb. et*  
*Maur.* Fl. rom. prodr. p. 273.

*Leontodon Taraxacum* *Linn.* Sp. pl. 2. p. 1122.  
*Vitm.* Sum. pl. IV. 395. *Petagna.* Instit. IV. 1494.  
*Ucr.* Hort. p. 332. *Tenor.* Fl. nap. pr. p. XLVI.  
*Brign. et Bod.* Met. 36. *Bartalin.* Sien. p. 70.  
*Sav.* Fl. pis. 2. p. 222. *Tur.* Clav. p. 23. *Bertol.*  
Pl. gen. p. 1001. *Am. it.* p. 182. *Mor.* Stirp. Sard.  
p. 28. *All.* Fl. ped. 1. p. 208. *Balb.* Fl. taur.  
p. 129. *Re* Fl. segus. p. 64. *Birol.* Fl. acon. 2.  
p. 53. *Nocc. et Balb.* Fl. tic. 2. p. 85. *Comol.*  
Fl. Com. pr. p. 148. *Mairon.* Berg. p. 62. *Re.* Fl.  
at. p. 88. *Lanfoss.* Mant. p. 122. *Pollin.* Fl. ver.  
2. p. 572. *Marzar.* Vic. p. 43. *Roman.* Eugan.  
p. 21. *Ruch.* Ven. p. 123. *Moric.* Fl. ven. 1.  
p. 325. *Naccar.* Fl. ven. 4. p. 69. *Mazzuc.* Alp.  
giul. p. 20. Fl. dan. t. 574.

*Leontodon officinalis* *With.* Arr. 679.

*Leontodon vulgare* *Lam.* Fl. fr. 2. p. 113.

*Hedypnois Taraxacum* *Scop.* Fl. carn. 2. p. 99.

*Aphaca Cuspalpin.* De pl. p. 508.

*Chondrilla di Galeno* *Anguil.* Sempl. p. 108.

*Dens leonis* *Matt.* Com. ed. Valgr. 1558. p.

289. f. 1. *Zannich. Ven. p. 85. Ponted. Diss. bot. p. 85.*

Dens leonis latiore folio *Bauh. Pinac. p. 126. Tourn. Inst. p. 468.*

Floret. Aprili, Majo et Junio. 2

Cichorium Intybus et Taraxacum Leontodon usurpantur praxi medica sub forma extracti et decocti contra saburras pituitosas, enphraxim viscerum abdominalium, et febres intermittentes simplices. Principium quod in hisce plantis supereminet est amaro-solvens. Quoad usum therapeuticum Taraxici vide. *Dissert. Parolli supra citatam.*

*Genus II. — Crepis Moench.*

Receptaculum nudum. Calyx calyculatus, squamis deciduis. Pappus pilosus, sessilis quandoque stipitatus.

*Species 1. Crepis Tectorum Linn.*

Foliis glabriusculis, lanceolato-runcinatis, laciniiis adscendentibus, summis linearibus, filiformi-sagittatis, amplexicaulibus, floribus corymbosis, calycibus pubescentibus. *Linn. Sp. pl. p. 135. Fl. tic. 2. p. 93. Flor. danic. t. 501.*

Floret Augusto et Septembri. ☉

SYNGENESIA POLYGAMIA SUPERFLUA.

*Genus I — Erigeron Linn.*

Flores radiati. Receptaculum nudum. Pappus pilosus. Corollae radii lineares, angustissimae.

*Species 1. Erigeron Canadense Linn.*

Caulē recto, hirtō, foliis lanceolato-oblongis, dentatis, ciliatis, floribus paniculatis. *Linn. Sp. pl.* p. 1210. *Fl. tic. 2.* p. 119. *Fl. dan. t.* 292. *Engl. bot. t.* 2019.

Floret Julio et Augusto. ☉

Haec planta est oriunda America Septentrionali, sed nunc in arvis siccis, in sylvis arenosis et ruderalis communis.

## MONOECIA TETRANDRIA.

*Genus I. — Urtica Linn.*

Flores masculi. — Calyx tetraphyllus; corolla nulla. Nectarium centrale cyatiforme.

Flores feminei. — Calyx diphyllus. Corolla nulla. Semen unicum; superam, nitidum.

*Species 1. Urtica Urens Linn.*

Folii oppositis, ellipticis, argute serratis; racemi axillares sub-simplices, geminati, petiolo breviores. *Linn. Sp. pl.* p. 1396. — *Fl. tic. 2.* p. 183. — *Flor. danic. t.* 739.

Floret aestivis mensibus. ☉

*Species 2. Urtica Dioica Linn.*

Foliis oppositis cordatis, ovato-lanceolatis, grosse serratis, floribus dioicis, spicis paniculatis glo-

meratis geminatis, petiolo longioribus. *Linn. Sp. pl.* p. 1396. — *Fl. tic.* p. 183. — *Flor. danic.* t. 746.

Floret aestate et autumno. 2

Apud medicos antiquiores quammaxime urtica tam interne quam externe commendabatur. Revera propter principium adstringens in hoc vegetabile contentum contra blenorhoeas omnes et haemorrhagias usurpata est. *Lange et Quarin* urticam in haemophthoe et phthisi proficuum dixerunt. Urticationes laudantur externe in paresi, paralyti, syncopibus et asphyxia. Quoque in apoplexia, rheumate, nevralgiis, dermatitibus re-tropulsis, nec non in periodo algida cholerae asiatici urtica externe uti optimum revellens e-molumentum aegrotantibus suppeditavit.

MONOECIA PENTANDRIA.

Genus I. — *Amaranthus* *Linn.*

Flores masculi. — Calyx triphyllus vel pentaphyllus. Corolla nulla. Stamina tria aut quinque.

Flores feminei. — Calyx maris. Corolla nulla. Styli tres. Capsula unilocularis, circumscissa. Semen unicum.

*Species 1. Amaranthus Blitum* *Linn.*

Glomerulis triandris subspicatis, floribus tri-

80

phyllis, foliis ovatis, retusis caule diffuso. *Lin.*  
*Sp. pl.* p. 1405. — *Fl. tic.* 2. p. 185. — *Engl.*  
*bot. t.* 2212.

Blito rosso *Matt.* ed. Valgr. 1585. 1. p. f. 480.

Floret Julio et Augusto. ☉

Diversae adhuc forent species in hac disserta-  
 tione enumerandae ex eo quod semel inventae  
 fuere in atrio potissimum alias appellato *del*  
*Leano* quemadmodum essent: *Raphanus Landra*,  
*Bunias Erucago*, *Ranunculus Acris* et etiam  
*Convolvulus Purpureus*. Ast quum hae stirpes  
 hisce temporibus haud amplius inveniantur, hinc  
 minime ratus sum inter plantas sponte crescen-  
 tes hisce locis adnumerare. Proinde nemo mire-  
 tur si armis proximis aliquam inveniatur speciem  
 hoc opusculo omissam, et e contra nonnullae de-  
 ficiant quas nunc exposui, nam hoc prae aliis  
 causis pendet ex majori vel minori solertia qua  
 sub initio anni scholastici cavaedia expurgantur,  
 et stirpes divelluntur. — A. 1772

FINIS.

# Theses defendendae.

—0—

1.

*Extincto sensu , motum quoque muscularem imperfectum evadere.*

2.

*Hydropem quoque neque ab irritatione , neque a phlogosi oriundum , phlebotomia solvi.*

3.

*Nervum decimum ex diversis tum officio tum origine nervis compositum.*

4.

*Cordis vulnera nequaquam absolute letalia.*

5.

*Motus fetus activos a nervis spinalibus stricte talibus , repetendos.*

6.

*Prodigiosam ampliacionem linguae Chamaeleonis , cum penis , papillae mammae etc. intumescencia comparandam.*